

Bisocor®

Bisoprolol Fumarate

Forms and Presentation

Bisocor® 2.5: Film coated tablets : Box of 30.

Bisocor® 5: Film coated tablets : Box of 30.

Bisocor® 10: Film coated tablets : Box of 30.

Composition

Bisocor® 2.5: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 2.5mg.

Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, talc, titanium dioxide.

Bisocor® 5: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 5mg.

Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, xanthan gum, lecithin, polyethylene glycol, talc, titanium dioxide, tartrazine.

Bisocor® 10: Each film coated tablet contains Bisoprolol Fumarate 10mg.

Excipients: lactose, microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate, crospovidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol, methacrylic acid and ethyl acrylate copolymer, sodium bicarbonate, talc, titanium dioxide, red iron oxide, yellow iron oxide.

Why should you take Bisocor®?

Therapeutic class: Beta blocking agents.

ATC code: C07AB07.

Bisocor® is a beta-blocker prescribed to control high blood pressure. It works by decreasing the force and rate of heart contractions, consequently leading to a reduction in the heart's demand for oxygen. Bisocor® can be used alone or in combination with other hypotensives.

What should you know about Bisocor®?

Bisocor® helps control high blood pressure. Like other hypotensives, Bisocor® is not a cure for essential hypertension. Stopping Bisocor® suddenly may lead to cardiac problems, thus you should always stick to your doctor's instructions and never stop the medication even if you are feeling well. This is especially important if you have coronary artery disease.

What is the recommended dosage of Bisocor®?

Adults

Dosage of Bisocor® should be titrated to each individual's needs. The usual starting dose is 5mg once daily. Dosage could be increased to 10 or 20mg once daily depending on patient's response to the medication. The recommended starting dose is 2.5mg once daily in asthmatic patients or in patients suffering from kidney or liver diseases.

Children

Bisocor® has not been adequately studied in children.

What to do if you miss a dose?

Take the forgotten dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the one you missed and go back to your regular schedule. Do not take 2 doses at the same time.

What to do in case of overdose?

Any medication taken in excess may lead to serious consequences. If you suspect an overdose of Bisocor®, seek medical attention immediately.

Symptoms of Bisocor® overdose may include:

Congestive heart failure (marked by fatigue, lower limbs edema including legs, feet, and ankles), difficulty in breathing, decreased heart rate, hypotension, and decreased blood sugar.

Are there any food or drug interactions with Bisocor®?

Bisocor® can be taken concomitantly with most medications. However it is important to consult your physician before combining Bisocor®

with any of the following drugs:

Beta-blockers (such as Atenolol, Metoprolol and Propranolol), Calcium channel blockers (such as Verapamil and Diltiazem), Clonidine, Disopyramide (and similar drugs used to treat irregular heartbeat), Epinephrine, Rifampin, Guanethidine, and Reserpine.

What are the side effects of Bisocor®?

The most common side effects are:

Dizziness, fatigue, headache, upper respiratory infections, runny nose, swelling, and diarrhea.

Precautions about Bisocor®

Treatment with Bisocor® must not be stopped abruptly unless recommended by your physician.

Bisocor® must be used with caution in patients with asthma or bronchial problems, kidney or liver diseases, coronary artery disease, and peripheral vascular disease. Consult your physician if you have a history of congestive heart failure, and suffered from any breathing problems, or slow heart beat while on therapy with Bisocor®.

Bisocor® may mask the symptoms of low blood sugar, or affect blood sugar levels, and may mask the symptoms of overactive thyroid.

Bisocor® may alter the response to epinephrine in patients with history of severe allergic reactions that require treatment with epinephrine.

Bisocor® may decrease alertness or make some people drowsy, so do not drive or participate in hazardous activities until you know how your body responds to the medication.

Finally you should inform your doctor or dentist that you are taking Bisocor® before any dental operation or other surgery or in cases of medical emergency.

What are the cases in which you should not take Bisocor®?

You should inform your physician in case you have low blood supply to the circulatory system or other cardiac problems such congestive heart failure, irregular or slow heartbeat, so he can decide on whether it is safe for you to take Bisocor® or not.

What should you do if you are pregnant or breastfeeding?

Bisocor® has not been adequately studied during pregnancy, thus inform your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant while on therapy with Bisocor®.

It is not known if Bisocor® is secreted in human milk, thus your doctor will inform you what to do if you are breastfeeding while on therapy with Bisocor®. If Bisocor® is essential to your health, your doctor may advise you to discontinue breastfeeding until your treatment with Bisocor® is finished.

How to store Bisocor®?

Store below 30°C.

Keep in original pack in intact conditions.

Revision date: March 2016.

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use, and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Medicament: keep out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

Benta S.A.L.
Dbayeh - Lebanon

بيزوكور®

بيزوبرولول فومارات

الأشكال والعبوات

بيزوكور ٢٠٥: أقراص ملبسة بالفيلم: عليه من ٣٠ قرصاً.

بيزوكور ٥: أقراص ملبسة بالفيلم: عليه من ٣٠ قرصاً.

بيزوكور ١٠: أقراص ملبسة بالفيلم: عليه من ٣٠ قرصاً.

التركيب

بيزوكور ٢٠٥: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ٢٠٥ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول فومارات.

السواغات: لاكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسيفيدون، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، هيدروكسي بروبيل ميثيل السلولوز، غليكول بولي إيثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم.

بيزوكور ٥: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ٥ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول فومارات.

السواغات: لاكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسيفيدون، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، كحول البولي فينيل، صمغ الزانتان، ليسيتين، غليكول بولي إيثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم، تارترازين.

بيزوكور ١٠: يحتوي كل قرص ملبس بالفيلم على ١٠ ملغ من العامل الفعال بيزوبرولول فومارات.

السواغات: لاكتوز، سلولوز بلوري مكروي، فوسفات ثنائية الكالسيوم، كروسيفيدون، ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، ماغنيزيوم ستيارات، كحول البولي فينيل، البولي إيثيلين جلايكول، بركريونات الصوديوم، حمض ميثاكرليك وإيثيل أكريليت كوبوليمر، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأحمر، أكسيد الحديد الأصفر.

لما يجب تناول بيزوكور؟

الغثة العلاجية: محصر للمستقبلات - بيتا.

الرمز الكيميائي العلاجي التشريحي (ATC): C07AB07.

إن بيزوكور محصر بيتا ويوصف للتحكم بارتفاع ضغط الدم. فهو يعمل على تخفيض قوة انقباضات القلب ومعدلها، مما يؤدي إلى تخفيض طلب القلب لمادة الأوكسجين. يجوز تناول بيزوكور لوحده أو بالتزامن مع غيره من الأدوية المخفضة لضغط الدم.

ما هي المعلومات الضرورية حول بيزوكور؟

يساعد بيزوكور على التحكم بضغط الدم المرتفع. مثل غيره من الأدوية المخفضة لضغط الدم، هو ليس علاجاً لارتفاع ضغط الدم الأولي. إن التوقف فجأة عن تناول بيزوكور قد يسبب مشاكل في القلب، لذلك عليك الالتزام بإرشادات طبيبك وعدم التوقف عن تناول الدواء حتى ولو شعرت بأنك في حالة صحية جيدة. هذا الأمر مهم للغاية خاصة إذا كنت مصاباً بمرض في شرايين القلب التاجية.

ما هي الجرعات الموصى بها من بيزوكور؟

للبالغين

يجب تعيين جرعة بيزوكور بحسب حاجات كل فرد. تبلغ الجرعة اليومية المعتادة في بداية العلاج ٥ ملغ. يمكن زيادة الجرعة اليومية إلى ١٠ أو ٢٠ ملغ بحسب استجابة المريض للدواء. أما الجرعة الموصى بها في بداية العلاج فهي ٢٠٥ ملغ يومياً للمرضى المصابين بالربو أو للمرضى المصابين بأمراض كلوية أو كبدية.

للأولاد

لم تدرس دراسات وافية حول استعمال بيزوكور عند الأولاد.

ما العمل عند نفوٲ موعء إحدى الجرعات؟

تناول الجرعة التي فاتتها حالما تترك أنك نسيته. في حال تذكرت ذلك عندما يحين موعد الجرعة التالية، أهمل الجرعة التي فاتتها واستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفرطة؟

إن تناول جرعة مفرطة من أي دواء ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفرطة، استشر طبيبك فوراً.

قد تشمل الأعراض الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من بيزوكور ما يلي:

فشل القلب الإحتقاني (الذي يتجلى في الشعور بالتعب كما يتجلى في ظهور وذمات في الأطراف السفلى، ومن ضمنها الساقان، والقدمان، والكاحلان)، الشعور بصعوبة في التنفس، تذبذب معدل دقات القلب، انخفاض في ضغط الدم وفي مستوى السكر في الدم.

هل من تءادل بين بيزوكور وأي طعام أو دواء؟

يمكن تناول بيزوكور مع معظم الأدوية؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل تناول بيزوكور بالتزامن مع أي من الأدوية التالية:

محصرات بيتا (مثل أتينولول، ميتوبرولول، وبروبرانولول)، ومحصرات الكالسيوم (مثل فيراباميل وديلتيازيم)، وكوليدين، وديزوبيراميد (وغيرها من الأدوية المماثلة التي

تعالج مشكلة عدم انتظام دقات القلب)، وإيبينيفرين، وريفامبين، وغوانيثيدين وريسبيرين. ما هي التآثيرات الجانبية لبيزوكور؟

قد تتضمن التآثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً ما يلي:

الدوخة، التعب، الصداع، الإلتهابات في المسالك التنفسية العليا، إرتشاح الأنف، التورم، والإسهال.

الإحتياطات الواجب إتخاذها عند تناول بيزوكور

يجب عدم توقيف العلاج بدواء بيزوكور فجأة إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.

يجب توخي الحذر عند وصف بيزوكور للمصابين بالربو أو للذين يعانون مشاكل في القصبات الهوائية، وللمصابين بأمراض في الكلى والكبد، وبأمراض في شرايين القلب التاجية، وبأمراض في الأوعية الدموية المحيطة. استشر طبيبك في حال سبق لك أن تعرضت لفشل القلب الإحتقاني أو تعرضت لأية مشاكل في التنفس أو في حال صارت دقات قلبك بطيئة في خلال خضوعك لعلاج بدواء بيزوكور.

من المحتمل أن يحجب بيزوكور أعراض انخفاض مستويات السكر في الدم، أو قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، كما من المحتمل أن يحجب الأعراض الناتجة عن إرتفاع نشاط الغدة الدرقية.

من المحتمل أن يؤثر بيزوكور على الإستجابة لمادة إيبينيفرين عند المرضى الذين سبق لهم أن تعرضوا لمشاكل محاسية حادة تتطلب علاجاً بمادة إيبينيفرين.

من المحتمل أن يخفض بيزوكور مستويات التيقظ أو أن يسبب النعاس عند البعض، لذلك يجب الإمتناع عن قيادة المركبات أو عن المشاركة في نشاطات خطيرة لحين تتأكد من كفاية إستجابة جسمك للدواء.

أخيراً، يجب إعلام طبيبك بالمعالج أو طبيب الأسنان بأنك تتناول بيزوكور قبل الخضوع لأي عملية في الأسنان أو أي عملية جراحية أو في حالات الطوارئ.

ما هي الحالات التي يجب الإمتناع فيها عن تناول بيزوكور؟

يجب إعلام طبيبك في حال كنت تعاني إنخفاضاً في مستويات الدم الذي يروي الدورة الدموية أو أية مشاكل قلبية مثل فشل القلب الإحتقاني، وتباطؤ دقات القلب أو عدم إنتظامها، وعلى ضوء ذلك، يقرر الطبيب ما إذا كان تناول بيزوكور مأموناً لك أم لا.

ما العمل في حالات الحمل والإرضاع؟

نظراً إلى غياب أي دراسة وافية حول وصف بيزوكور خلال فترة الحمل، عليك بالتالي إعلام طبيبك في حال كنت حاملاً أو تخططين للحمل، إذا كنت تخضعين لعلاج بدواء بيزوكور.

كما لم يتم التحقق من أن بيزوكور يُفرز في حليب الأم، وبالتالي على طبيبك أن يطلعك على التدابير الواجب إتخاذها إذا كنت ترضعين طفلك خلال فترة العلاج بدواء بيزوكور.

في حال كان دواء بيزوكور ضرورياً لضمان سلامة صحتك، قد ينصحك طبيبك بتوقيف الإرضاع لحين ينتهي العلاج بدواء بيزوكور.

كيف يُحفظ بيزوكور؟

يُحفظ بيزوكور في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية.

يجب حفظه في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ المراجعة: آذار ٢٠١٦.

هذا دواء:

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.
- إحتفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مؤتمر وزراء الصحة العرب
وإئتاد الصيدلة العرب

بنشاء ش.م.ل.
ضحية - لبنان