

CartiFlex®

AMOUNT PER SERVING (3 TABLETS)

Glucosamine Sulfate. 2KCl.....1500mg
Chondroitin Sulfate.....1200mg
Methylsulfonylmethane(MSM).....500mg
Excipients: microcrystalline cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, talc, polyethylene glycol, methacrylic acid copolymer, sodium bicarbonate.

PHARMACEUTICAL FORM & PRESENTATION

CartiFlex®:Tablets: Box of 60.

CartiFlex® IS INDICATED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- CartiFlex® nourishes the joints and promotes healthy cartilage formation and maintenance to help you move freely and comfortably.
- CartiFlex® can help persons or weekend athletes desiring extra support for their joints.
- CartiFlex® can provide long-term nourishment and support for over-stressed joints and cartilage especially in overweight individuals.
- CartiFlex® can provide the lubrication necessary to support comfortable movement and range of motion in all individuals having an active lifestyle.

CartiFlex® IS NOT RECOMMENDED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- Hypersensitivity to any of its components.
- Allergy to sulfur.

PRECAUTIONS

Consult your physician if you have any health problems or if you are being treated with any medication prior to taking any over the counter (OTC) product.

INTERACTIONS OF CartiFlex® WITH OTHER DRUGS

Consult your physician if you are being treated with any medication prior to taking any OTC

product.

PREGNANCY AND LACTATION

Pregnant and lactating women should consult their physician before taking any OTC product.

MODE OF ADMINISTRATION

Adults

Take 1 tablet 3 times daily, preferably with a meal.

UNDESIRABLE EFFECTS

Gastrointestinal discomfort or allergic reactions may occur in some individuals.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store below 30°C protected from humidity. Keep in original pack in intact conditions.

Date of revision: February 2014.

كار تيفليكس[®]

الكمية لكل جرعة (٣ أقراص)

سلفات	الغلوكوزامين	كلوريد	البوتاسيوم
٢KCl	١٥٠٠	ملغ
سلفات الكوندرويتين	١٢٠٠	ملغ
ميثيل سلفونيل ميثان	٥٠٠	ملغ
السواغات : ثنائي أكسيد السيليكون الغرواني، سلولوز بلوري مكروي، ستيرات المغنيزيوم، كحول البولي فينيل، ثنائي أكسيد التيتانيوم، طلق، بيكاربونات الصوديوم، كوبوليمر حامض الميناكريليك، بولي ايثيلين الغليكول.			

الحمل والرضاعة

على النساء استشارة طبيبهن في فترة الحمل والرضاعة قبل الإقدام على تناول أي غُفار يُباع من دون وصفة طبية .

طريقة الاستعمال

عند البالغين
يجب تناول قرصاً واحداً ٣ مرات يومياً ومن المُستحسن تناوله مع وجبة طعام.

التأثيرات غير المرغوب فيها

يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص لانزعاج معدي معوي أو لتفاعلات أرجية.

إرشادات خاصة بطريقة الحفظ

يجب حفظ هذا المستحضر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة.
يجب حفظ هذا المستحضر في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ المراجعة: شباط ٢٠١٤ .

الشكل الصيدلاني والعبوة

تحتوي العبوة على ٦٠ قرصاً.

يوصف كار تيفليكس[®] في الحالات التالية

- يُعدّي كار تيفليكس[®] المفاصل كما يُعزّز التكوّن الصحي للغضاريف ويحافظ عليها فيساعد على التحرك بحرية وراحة تامة.

- يمكن أن يساعد كار تيفليكس[®] الأشخاص أو الذين يمارسون الرياضة في خلال عطلة نهاية الأسبوع على الحصول على ما يحتاجون إليه من دعم إضافي لمفاصلهم.

- يمكن أن يؤمن كار تيفليكس[®] تغذيةً ودعمًا على المدى الطويل للمفاصل والغضاريف الخاضعة لإجهاد مفرط خاصة عند الأفراد الذين يعانون من الوزن الزائد.

- يمكن أن يؤمن كار تيفليكس[®] التشحيم الضروري لدعم حركة التنقل بشكل مريح وتوسيع المدى الحركي عند كل الأفراد الذي يتبعون نمط حياة نشيط.

يُمنع استعمال كار تيفليكس[®] في الحالات التالية

- فرط التحسس لأي من مكونات هذا المستحضر .
- حساسية لمادة الكبريت.

الإحتياطات

يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول أي غُفار يُباع من دون وصفة طبية عند المعاناة من مشاكل صحية أو عند الخضوع لعلاج دوائي.

تفاعلات كار تيفليكس[®] مع أدوية أخرى

يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول أي غُفار يُباع من دون وصفة طبية عند الخضوع لعلاج دوائي.