

RozyCal® D3

COMPOSITION

Calcium carbonate.....1500mg

(Equivalent to Calcium 600mg)

Cholecalciferol.....10mcg

(Equivalent to 400 IU of Vitamin D3)

Excipients: Pregelatinized starch, Modified Food Starch, Sucrose, Sodium Ascorbate Crystalline, Medium Chain Triglycerides, Silicon Dioxide, all-rac-a-Tocopherol, Isomalt, Croscarmellose Sodium, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Sucralose, Povidone K90, Orange Flavor.

PHARMACEUTICAL FORM & PRESENTATION

Tablets pack of 60.

ROZYCAL® D3 IS INDICATED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- Prevention of calcium deficiency in adults & elderly.
- In cases of calcium and Vitamin D deficiency in adults and elderly.
- As an adjuvant to osteoporosis treatment if needed.

ROZYCAL® D3 IS NOT RECOMMENDED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- Hypersensitivity to Vitamin D or to any component.

PRECAUTIONS

- In case of simultaneous treatment with sodium fluoride or biphosphonate, it is advised to keep an interval of 2 hrs between doses, and in case of treatment with an antibiotic of the family of tetracyclines, it is advised to keep an interval of 3 hrs between doses.
- Consult your physician if you have renal

insufficiency prior to taking any OTC product.

INTERACTIONS OF ROZYCAL® D3 WITH OTHER DRUGS

Consult your physician if you are being treated with digitalics, cyclines, biphosphonates, estramustine and iron salts while taking Rozy-cal® D3.

PREGNANCY AND LACTATION

Pregnant & Lactating women should consult their physician before taking any over the counter (OTC) product.

MODE OF ADMINISTRATION

1-2 tablets per day to be taken with a glass of water.

UNDESIRABLE EFFECTS

Calcium intake may cause in some individuals constipation or diarrhea, bloating, or nausea.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store below 30°C protected from humidity. Keep in original pack in intact conditions.

Date of revision: April 2024.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer

Benta S.A.L

Dbayeh - Lebanon



روزيكال® د ٣

التركيب

كربونات الكالسيوم.....١٥٠٠ ملغ (مساو لـ ٦٠٠ ملغ من الكالسيوم)
كوليكالسيفيرول.....١٠ ميكروغرام (مساو لـ ٤٠٠ وحدة دولية من فيتامين د٣)
السواغات: بريجلنتيذد نشاء، نشا الطعام المعدل، السكروز، بلوري أسكوروبات الصوديوم، الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، ثاني أكسيد السيليكون، أول-راك-توكوفيرول، إيزومالت، كروس كارميلوز الصوديوم، سيليلوز دقيق التبلور، إستيرات المغنيزيوم، سكرالوز، بوفيدون ك٩٠، نكهة البرتقال.

الشكل الصيدلاني والعبوة

تحتوي العبوة على ٦٠ قرصاً.

يوصف روزيكال® د ٣ في الحالات التالية

- وقاية البالغين والمستئين من الإصابة بنقص في الفيتامين د.
- علاج حالات إصابة البالغين والمستئين بنقص في الفيتامين د.
- دعم علاج ترقق العظام عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

يُمنع استعمال روزيكال® د ٣ في الحالات التالية

- في حالات فرط التحسس للفيتامين د أو لأي مكون.

الإحتياطات

- عند الخضوع لعلاج بفلوريد الصوديوم أو بالفوسفونات الثنائية بالتزامن مع هذا العقار، يُنصح بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين ساعتين. أما في حال الخضوع لعلاج بالمضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين بالتزامن مع هذا العقار فيُنصح بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين ثلاث ساعات.
- يجب استشارة الطبيب المعالج في حال الإصابة بقصور كلوي قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبيّة.

تفاعلات روزيكال® د ٣ مع أدوية أخرى

يجب استشارة الطبيب المعالج عند الخضوع لعلاج بالديجيتال، والسيكلين، والفوسفونات الثنائية، والإستراموستين، وأملاح الحديد بالتزامن مع روزيكال® د ٣.

الحمل والرضاعة

على النساء استشارة طبيبهن في فترة الحمل والرضاعة قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبيّة.

طريقة الاستعمال

يتم تناول قرص واحد إلى قرصين مع كوب من الماء.

التأثيرات غير المرغوب فيها

يمكن أن يسبب تناول الكالسيوم عند بعضهم الإمساك، أو الإسهال، أو انتفاخ البطن، أو الغثيان.

إرشادات خاصة بطريقة الحفظ

يجب حفظ هذا المستحضر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة.
يجب حفظ هذا المستحضر في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

تاريخ مراجعة هذه النشرة: نيسان ٢٠٢٤.

صاحب إجازة التسويق والمصنّع

بنتا ش.م. ل

ضبيه - لبنان

