

# RozyCal® D3

## COMPOSITION

Calcium carbonate.....1500 mg  
(Equivalent to Calcium 600 mg)

Cholecalciferol.....10 mcg  
(Equivalent to 400 IU of Vitamin D3)

Excipients: pregelatinized starch, modified food starch, sucrose, sodium ascorbate crystalline, medium chain triglycerides, silicon dioxide, all-rac- $\alpha$ -tocopherol, isomalt, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, sucralose, povidone k90, orange flavor.

## PHARMACEUTICAL FORM & PRESENTATION

Pack of 60 tablets.

## ROZYCAL® D3 IS INDICATED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- Prevention of calcium deficiency in adults and elderly.
- In cases of calcium and Vitamin D deficiency in adults and the elderly.
- As an adjuvant to osteoporosis treatment if needed.

## ROZYCAL® D3 IS NOT RECOMMENDED IN THE FOLLOWING CONDITIONS

- Hypersensitivity to Vitamin D or to any of the excipients.

## PRECAUTIONS

- In case of simultaneous treatment with sodium fluoride or bisphosphonates, it is advised to keep an interval of 2 hours between doses, and in case of treatment with an antibiotic from the tetracycline family, it is advised to keep an interval of 3 hours between doses.
- Consult your physician if you have renal

insufficiency before taking any over the counter (OTC) product.

## INTERACTIONS OF ROZYCAL® D3 WITH OTHER DRUGS

Consult your physician if you are being treated with digitalis, cyclines, bisphosphonates, estramustine or iron salts while taking Rozycal® D3.

## PREGNANCY AND LACTATION

Pregnant and lactating women should consult their physician before taking any OTC.

## MODE OF ADMINISTRATION

Take 1–2 tablets per day with a glass of water.

## UNDESIRABLE EFFECTS

Calcium intake may cause constipation, diarrhea, bloating, or nausea in some individuals.

## STORAGE INSTRUCTIONS

Store below 30°C. Protect from humidity. Keep in original pack in intact conditions.

**Date of revision:** March 2026.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer:

**Benta S.A.L.**

Zouk Al Khrab 104, Dbayeh, Lebanon



## روزيكال® د ٣

### التركيب

كربونات الكالسيوم.....١٥٠٠ ملغ  
(مساو لـ ٦٠٠ ملغ من الكالسيوم)  
كوليكالسيوم ١٠ ميكروغرام  
(مساو لـ ٤٠٠ وحدة دولية من فيتامين د٣)  
المواد غير الفعالة: بريدجلائينيزد نشاء، نشا الطعام  
المعدل، السكروز، أسكورات الصوديوم البلوري،  
الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، ثاني أكسيد السيليكون،  
أول-راك- ألفاتوكوفيرول، إيزومالت، كروس كارميلوز  
الصوديوم، سيليلوز دقيق التبلور، ستيرات المغنيسيوم،  
سكرالوز، بوفيدون ك٩٠، نكهة البرتقال.

### الشكل الصيدلاني والعبوة

تحتوي العبوة على ٦٠ قرصاً.

### يوصف روزيكال® د ٣ في الحالات التالية

- وقاية البالغين والمسنين من الإصابة بنقص في الفيتامين د.
- علاج نقص الكالسيوم وفيتامين د لدى البالغين والمسنين.
- داعم لعلاج ترقق العظام عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

### يُمنع استعمال روزيكال® د ٣ في الحالات التالية

- في حالات فرط التحسس للفيتامين د أو لأي من مكونات المستحضر.

### الإحتياطات

- في حال العلاج المتزامن بفلوريد الصوديوم أو بالبيسفوسفونات، يُنصح بأن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين ساعتين. في حال العلاج المتزامن بمضاد حيوي من عائلة التتراسيكلينات، يُنصح بترك فاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بين الجرعات .
- يجب استشارة الطبيب في حال تعاني من قصور كلوي قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبية.

### تفاعلات روزيكال® د ٣ مع أدوية أخرى

استشر طبيبك إذا كنت تتلقى علاجاً بالديجيتاليات، السيكلينات، البيسفوسفونات، إسترموستين وأملاح الحديد أثناء تناول روزيكال® د ٣.

### الحمل والرضاعة

على النساء استشارة طبيبهن في فترة الحمل والرضاعة قبل الإقدام على تناول أي عُقار يُباع من دون وصفة طبية.

### طريقة الاستعمال

تؤخذ جرعة مقدارها قرص واحد إلى قرصين يومياً مع كوب من الماء.

### التأثيرات غير المرغوب فيها

قد يسبب تناول الكالسيوم لدى بعض المرضى الإمساك أو الإسهال أو انتفاخ البطن أو الغثيان.

### إرشادات خاصة بطريقة الحفظ

يجب حفظ هذا المستحضر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٣٠ درجة مئوية وبعيداً عن الرطوبة. يجب حفظ هذا المستحضر في العبوة الأصلية بحالة سليمة.

### تاريخ المراجعة: آذار ٢٠٢٦.

صاحب ترخيص التسويق والشركة المصنعة:

بنتاش.م.ل.

ذوق الخراب ١٠٤ ، ضبيه، لبنان

